

ໄດ້ຮັບຂໍ້ເທັດຈິງ.

ອັກຊິນແມ່ນພຣີສໍາລັບທຸກຄົນ.



ແຕ່ຕ້ອງແນ່ໃຈ ແລະ ສອບຖາມວ່າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໃນການສັກຢາອັກຊິນຫຼືບໍ່.

- ບໍ່ມີໃຜຖືກປະຕິເສດການໃນຮັບຢາອັກຊິນ ເຖິງວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມບໍລິຫານກໍຕາມ.
- ເມື່ອຢາອັກຊິນໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ທຸກຄົນສາມາດສັກຢາອັກຊິນໂດຍບໍ່ສິນສະຖານະການເຂົ້າເມືອງ.
- ທຸກຄົນສາມາດໄດ້ສັກຢາອັກຊິນເມື່ອເປັນຜຽນຂອງພວກເຂົາ.


ອັກຊິນປ້ອງກັນທ່ານຈາກການເຕີດເຊື້ອໂຄວິດ-19.

- ຖ້າທ່ານຍັງເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຢາອັກຊິນແລ້ວ, ອັກຊິນປົກປ້ອງທ່ານຈາກການເປັນໄຂ້ຮຸນແຮງ.
- ເຖິງວ່າຖ້າທ່ານເປັນໂຄວິດ-19, ທ່ານຄວນຈະຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາອັກຊິນ.
- ມັນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ໄດ້ວ່າ ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດົນປານໃດຈາກການເປັນໂຄວິດ-19 ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.



ອັກຊິນໂຄວິດ-19 ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ອັກຊິນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນໂຄວິດ-19.


- ການຮັບສັກຢາ ອັກຊິນ ແມ່ນປອດໄພກວ່າການເປັນໂຄວິດ-19.
- ຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພຈາກການສັກຢາອັກຊິນ.
- ບໍ່ມີອັກຊິນຊະນິດໃດໄດ້ຖືກທົດສອບຫຼາຍສໍາລັບຄວາມປອດໄພ ຂອງມັນໃນປະຫວັດສາດສະຫະລັດອາເມລິກາ.
- ຢາອັກຊິນໄດ້ຖືກພິສູດວ່າປອດໄພໄດ້ຫຼາຍເທົ່ານີ້ ສໍາລັບຫຼາຍພັນຄົນ, ລວມທັງ ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍເຊື້ອຊາດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ອາຍຸ.
- ອັກຊິນໂຄວິດ-19 ບໍ່ປ່ຽນແປງ ດີເອັນເອ (DNA) ຂອງທ່ານ.



ຜົນຂ້າງຄຽງແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິ.


ຜົນຂ້າງຄຽງບໍ່ໝາຍເຖິງວ່າທ່ານເປັນໂຄວິດ-19.

- ຜົນຂ້າງຄຽງ ໝາຍເຖິງວັກຊີນກຳລັງສອນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບໂຄວິດ-19.
- ຜົນຂ້າງຄຽງອາດຈະປະກອບດ້ວຍ:
 - ການເຈັບປວດ ຫຼື ການບວມຢູ່ແຂນຂອງທ່ານບໍລິເວນທີ່ທ່ານສັກຢາວັກຊີນ.
 - ເຈັບຫົວ, ໜາວສິ້ນ, ຫຼື ເປັນໄຂ້.
- ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການໃຊ້ເວລາພັກສອງສາມມື້ຈາກການເຮັດ ວຽກຈົນກວ່າທ່ານຈະຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ.
- ທ່ານຕ້ອງພັກປະມານ 15-30 ນາທີ ຫຼັງຈາກທີ່ສັກຢາວັກຊີນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ແພ້ຢາ.



ບໍ່ມີຫຼັກຖານອັນໃດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັກຊີນ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ກ່ຽວກັບການເກີດຂອງປະຊາກອນ.

ແມ່ຍິງຖືພາຄວນຈະບອກໃຫ້ທ່ານໝໍຂອງພວກເຂົາຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາຄວນຈະສັກຢາວັກຊີນຫຼືບໍ່.



ວັກຊີນ ບໍ່ ບັນຈຸ

- ສານກັນຍູດ
- ໄຂ່
- ຜະລິດຕະພັນຈາກໝູ
- ເຈລາຕິນ
- ຢາງຈາກພືດ (Latex)
- ໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຊີວິດໄວຣັສ

ວັກຊີນບາງຊະນິດຕ້ອງການສັກສອງເຂັ້ມ ຂະນະທີ່ວັກຊີນບາງຊະນິດ ຕ້ອງການສັກພຽງແຕ່ເຂັ້ມດຽວ. ທັງສອງຊະນິດນີ້ແມ່ນປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ສຳລັບວັກຊີນທີ່ຕ້ອງສັກ ສອງ ເຂັ້ມ:

- ເຂັ້ມທຳອິດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກຽມພ້ອມ.
- ເຂັ້ມທີສອງແມ່ນຈະສັກໃຫ້ໃນສອງສາມອາທິດຫຼັງຈາກທີ່ແນ່ໃຈ ວ່າທ່ານມີ ການປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນ.
- ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງຮັບສອງເຂັ້ມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ການປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນ.

ຢູ່ຢ່າງປອດໄພພາຍຫຼັງທີ່ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ.

ປັດຈຸບັນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານບໍ່ຮູ້ວ່າວັກຊີນຈະປ້ອງກັນທ່ານໄດ້ດີປານໃດ. ເຖິງວ່າໄດ້ຮັບວັກຊີນແລ້ວກໍຕາມ, ໃຫ້ສືບຕໍ່:

-  **ໃສ່ໜ້າກາກ.**
-  **ປະຕິບັດໄລຍະ ຫ່າງຫ່າງສັງຄົມ.**
-  **ໜັ້ນລ້າງມື ຂອງທ່ານ ເລື້ອຍໆ.**
-  **ໜັ້ນຂ້າເຊື້ອບ່ອນ ທີ່ມີການສຳພັດ ເປັນປະຈຳ.**

