



JOHNSON & JOHNSON COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သိရှိရန် အချက်အလက်များ

ဘာဖြစ်ခဲ့ပါသလဲ


ဧပြီ 2021 အထိ သိရသမျှ လူပေါင်း 15 ဦးထက်မနည်းသည် J&J ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အကြာတွင် သွေးခဲမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသူများစုသည် အသက် 18 နှင့် 48 အကြား အမျိုးသမီး များ ဖြစ်ကြပါသည်။

သွေးခဲဖြစ်ပေါ်မှုသည် အလွန်အလွန် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

ဧပြီ 2021 အထိ အမေရိကန်တွင် လူပေါင်း 8 သန်းကျော်အား J&J COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

18 နှင့် 48 အကြား အမျိုးသမီးများ အတွက် သွေးခဲမှု ဖြစ်နိုင်ခြေမှာ လူ 1 သန်းလျှင် 7 ဦးဖြစ်သည်။ 49 နှစ်အထက် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားအသက်အရွယ်အားလုံးတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေမှာ ပိုမိုနည်းပါးပါသည်။

ဆိုလိုသည်မှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် တစ်စုံတစ်ဦးတွင်သွေးခဲမှု ဖြစ်နိုင်ခြေမှာ အလွန်အလွန်နည်းပါးပါသည်။



လူတို့သည် သွေးခဲခြင်းထက် COVID-19 ကြောင့်သာ အပြင်းအထန်များခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ဆုံးခြင်း ပိုမိုဖြစ်လွယ်ကြပါသည်။

လူသန်းပေါင်းများစွာသည် J&J ကာကွယ်ဆေးကို ဘေးကင်းစွာ ထိုးပြီးပါပြီ။ ထိုအထဲတွင် လူမျိုး၊ မျိုးနွယ်စုံ၊ အသက်အရွယ်စုံ ပါဝင်ပါသည်။



J&J သည် တစ်ကြိမ်သာ ထိုးရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆင်ပြေသက်သာ၊ ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်ပါသည်။

အခြားကာကွယ်ဆေး အမျိုးအစားများလည်း ရနိုင်ပါသည်။ ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ်ထိုးပြီးနောက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ် သွေးခဲမှုဖြစ်ပွားကြောင်း မကြားသိရပါ။

သင့်တွင် မေးမြန်းလိုသည်ရှိပါက ဆရာဝန်ကို ဆက်သွယ်ပြီး အခြားကာကွယ်ဆေးသည် သင့်အတွက် ပိုသင့်လျော်နိုင်မည်လား မေးမြန်းပါ။



စောင့်ကြည့်ရမည့် လက္ခဏာများ



သွေးခဲမှုသည် ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း J&J ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး 3 ပါတ်အကြာတွင် သင့်မှာ ဖော်ပြပါ-လက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုခုရှိနေပါက ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းပြပါ

- အပြင်းအထန် သို့မဟုတ် အမြဲခေါင်းကိုက်ခြင်း
- အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်း
- အသက်ရှူခက်ခြင်း
- ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း
- ခြေထောက်ယောင်ရမ်းခြင်း
- အမြဲဗိုက်နာခြင်း
- ပွန်းပဲ့လွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးထိုးသည့်နေရာနောက်နား အရေပြားအောက်တွင် သွေးအစက်အပြောက်များ တွေ့ရခြင်း

J&J ကာကွယ်ဆေးသည် ဘေးကင်းပါသည်

ကာကွယ်ဆေးမှရသော ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို အမေရိကန်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအရာရှိများမှ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါသည်။ သူတို့သည် အဆင်မပြေမှုတိုင်းကို အလွန်အလေးထား ကိုင်တွယ်ကြပါသည်။

ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည် သွေးခဲမှုအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန် J&J ကာကွယ်ဆေးများကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြပါသည်။

ယခုလိုအလွန်ဖြစ်ခဲ့သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအတွက် ကာကွယ်ဆေးသုံးစွဲမှုကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းက သူတို့သည် ကာကွယ်ဆေးများကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြောင်း သိသာစေပါသည်။

ယခုအခါ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအရာရှိများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါပြီ



J&J ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ဖြစ်နိုင်သော သွေးခဲမှုသည် အလွန်အလွန် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်



သွေးခဲမှုကို ကုသပျောက်ကင်း နိုင်ပါသည်



ကာကွယ်ဆေး၏ အကျိုးကျေးဇူးက ၎င်းမှရနိုင်သည့် ဘေးဆိုးကျိုးထက် များစွာသာလွန်ပါသည်။

သင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ပါ။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ပါ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။

