

واکسین کووید-19 جانسن و جانسن حقایق را بدانید.



چه اتفاق افتاد


در اپریل 2021، بیشتر از 15 نفر که اکثریت از آنها زنانی بود که بین 18 تا 48 سال سن داشت، چند هفته پس از تزریق واکسین J&J دچار لخته شدن خون شدند.

لخته شدن خون بسیار نادر است

تا اپریل 2021، بیش از 8 میلیون واکسین J&J در آیالات متحده تزریق شده است.

در 1 میلیون زنانی که سنین شان بین 18 تا 48 سال بودند، تقریباً 7 زنان دچار لخته شدن خون شدند. در زنانی که سنین شان 49 سال یا بیشتر اند و برای همه مردان این ارقام حتی نادرتر اند.

این به این معنی است که احتمال لخته شدن خون بعد از تزریق واکسین بسیار نادر است.



به نسبت دچار لخته شدن خون، مردم از کووید-19 شدید مریض شده یا می میرند.

میلیونها نفر از جمله افراد از نژادها، اقوام و سنین مختلف بطور محفوظ واکسین J&J را دریافت کرده اند.

J&J فقط یک دوز تزریق می گردد، بنا بر این راحت، بی خطر و موثر است.



گزینه های دیگری واکسین موجود اند. لخته شدن خون به عنوان عوارض جانبی واکسین های که دو دوز تزریق می گردد، گزارش داده نشده است.

اگر هنوز هم پرسش دارید، با داکتر تان صحبت نمایید که آیا کدام واکسین دیگر برای تان بهتر است.



علائمی که باید به آنها توجه داشته باشید

گرچه لخته شدن خون بسیار نادر است، در صورت داشتن علائم ذیل در طی چند هفته پس از تزریق واکسین، فوراً به داکتر مراجعه کنید:



- سردرد شدید یا مداوم
- تاری دید
- نفس تنگی
- درد در قفس سینه
- ورم پاها
- درد شکم مداوم
- کبودی یا لکه های کوچک خونی زیر پوست در جاهای فراتر از جای پیچکاری

واکسین J&J بی خطر است

مقامات صحتی آیالات متحده مشکلات صحتی که از واکسین به میان می آیند، از نزدیک نظارت می کنند. آنها هر نگرانی را بسیار جدی می گیرند. برای اینکه معلومات بیشتر در مورد لخته شدن خون به دست بیاورند، مقامات صحتی توزیع واکسین J&J را متوقف ساخت. متوقف کردن واکسین برای چنین عارضه جانبی نشان می دهد که مقامات صحتی واکسین را از خیلی نزدیک مشاهده می کنند.

مقامات اکنون تعیین کرده اند که



خطر لخته شدن خون از واکسین J&J بسیار نادر است.



لخته شدن خون قابل معالجه است



به نسبت خطر، فواید این واکسین بسیار زیات است.

از خود تان محافظت کنید. از جامعه تان محافظت کنید. واکسین کنید.