



# VACCIN CONTRE LE COVID-19 JOHNSON & JOHNSON

# RENSEIGNEZ-VOUS.

## Ce qui s'est passé


En avril 2021, plus de 15 personnes, principalement des femmes âgées de 18 à 48 ans, ont développé des caillots sanguins quelques semaines après avoir reçu le vaccin J&J.

## Les caillots sanguins sont **EXTRÊMEMENT RARES**

En avril 2021, plus de 8 millions de vaccins contre le COVID-19 J&J ont été administrés aux États-Unis.

Chez les femmes âgées de 18 à 48 ans, des caillots sanguins se sont formés chez environ 7 femmes sur 1 million. Pour les femmes âgées de 49 ans et plus, et chez les hommes de tous âges, cela est encore plus rare.

Cela signifie que la possibilité de développer un caillot sanguin après avoir reçu le vaccin est extrêmement rare pour qui que ce soit.



Il y a beaucoup plus de risques de tomber gravement malade ou de mourir du COVID-19 que de développer un caillot sanguin.

Des millions de personnes ont été vaccinées en toute sécurité avec le vaccin J&J. Cela inclut des personnes de race, d'origine ethnique et d'âge différents.

1

Le vaccin J&J consiste en une injection seulement, et il est pratique, sûr, et efficace.

D'autres options de vaccins sont disponibles, comme les vaccins à deux injections qui n'ont pas produit de caillots sanguins comme effets secondaires.

Si vous avez encore des questions, parlez à votre médecin pour savoir si un autre vaccin serait plus adéquat pour vous.



## SYMPTÔMES À SURVEILLER



Bien qu'il y ait très peu de risques de développer des caillots sanguins dans les 3 semaines suivant une vaccination avec le J&J, consultez immédiatement un médecin si vous avez un des symptômes suivants :

- Maux de tête intenses ou persistants
- Troubles visuels
- Essoufflement
- Douleur thoracique
- Gonflement des jambes
- Douleur abdominale persistante
- Apparition facile d'hématomes ou taches de sang minuscules sous la peau au-delà du point d'injection

## LE VACCIN J&J EST SÛR

Les autorités sanitaires des États-Unis surveillent de près les problèmes de santé émanant des vaccins. Ils prennent tout problème très au sérieux.

Les autorités sanitaires ont mis les vaccins J&J en pause pour se renseigner davantage sur les caillots sanguins.

La mise en pause du vaccin pour un effet secondaire si rare indique que les autorités sanitaires surveillent les vaccins de très près.

### Les autorités sanitaires ont désormais déterminé que



Le risque de développer un caillot sanguin suite au vaccin J&J est extrêmement rare



Les caillots sanguins peuvent être traités



La balance bénéfices/risques du vaccin l'emporte largement sur ses risques

*Protégez-vous. Protégez votre communauté. **Faites-vous vacciner.***