



ВАКЦИНА ПРОТИ COVID-19 КОМПАНІЇ «JOHNSON & JOHNSON» ДІЗНАЙТЕСЯ ФАКТИ.

Що сталося


Станом на квітень 2021 року більш, ніж у 15 людей, переважно жінок віком 18-48 років, спостерігалось утворення тромбів через декілька тижнів після вакцинації вакциною «J&J».

Тромби утворюються НАДЗВИЧАЙНО РІДКО

Станом на квітень 2021 року у США було використано більше, ніж 8 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 компанії «J&J».

Серед жінок віком 18-48 років тромби зафіксовано приблизно у **7 осіб з 1 мільйона**. Серед жінок віком 49 років і старше, а також чоловіків будь-якого віку тромби є ще більш рідкісними.

Це означає, що ймовірність **для будь-якої людини** зазнати тромбозу після вакцинації є **надзвичайно рідкісною**.



Набагато більш ймовірним є те, що людина може серйозно захворіти або померти від COVID-19, ніж зазнати тромбозу.

Мільйони людей було **безпечно вакциновано** вакциною «J&J», зокрема людей різних рас, етнічних і вікових груп.

1

Вакцина «J&J» передбачає всього **одне введення**, тому є зручною, безпечною та ефективною.

Доступні інші варіанти вакцинації. Побічних ефектів у вигляді тромбів при вакцинації двохдозовими вакцинами зареєстровано не було.

Якщо у вас залишаються запитання, проконсультуйтеся з вашим лікарем щодо іншої вакцини, яка може краще відповідати вашим потребам.



СИМПТОМИ, ЯКІ ПОТРІБНО ВІДСЛІДКУВАТИ



Незважаючи на те, що утворення тромбів є дуже мало ймовірним, протягом **3 тижнів після вакцинації вакциною «J&J» невідкладно зверніться до лікаря, якщо у вас спостерігаються будь-які з цих симптомів:**

- Сильний або постійний головний біль
- Затуманений зір
- Задишка
- Біль у грудях
- набряки ніг
- Постійний біль у животі
- Легке утворення синців або незначні крововиливи під шкірою за межами місця ін'єкції

ВАКЦИНА «J&J» БЕЗПЕЧНА

Американські працівники охорони здоров'я уважно стежать за проблемами зі здоров'ям, пов'язаними з вакцинами. Вони сприймають будь-яку причину для занепокоєння дуже серйозно.

Працівники охорони здоров'я призупинили використання вакцин «J&J», щоб з'ясувати більше про тромби.

Призупинення вакцинації з огляду на такі рідкісні побічні ефекти вказує на те, що працівники охорони здоров'я дуже ретельно стежать за вакцинами.

Працівники охорони здоров'я на даний момент з'ясували:



Ризик тромбозу при використанні вакцини «J&J» є **надзвичайно рідкісним**



Тромби **піддаються лікуванню**



Користь вакцини значно перевищує будь-які ризики її застосування.

Захистіть себе. Захистіть свою спільноту. **Вакцинуються.**