

ຮູ້ຄວາມຈິງ.

ປັດຈຸບັນນີ້
ມີໃຫ້ສໍາລັບຄົນທີ່ມີ
ອາຍຸ 12 ຂຶ້ນໄປ

ປົກປ້ອງລູກຂອງທ່ານ.



ປ້ອງກັນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຈະປອດໄພ ທີ່ສຸດເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ.

ວັກຊີນປ້ອງກັນທຸກຄົນ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ, ຈາກການເປັນໂຄວິດ-19. ຢາວັກຊີນຍັງປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຈາກການເຈັບປ່ວຍຂັ້ນຮຸນແຮງຖ້າພວກເຂົາເຈັບປ່ວຍ.

ມີພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່, ລວມທັງສາຍພັນເດວຕ້າ, ຊຶ່ງມັນສາມາດແຜ່ລະບາດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຮຸນແຮງຂຶ້ນໄດ້. ວັກຊີນສາມາດປ້ອງກັນສາຍພັນເດວຕ້າໄດ້.



ການສັກຢາໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຈະຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນ ທີ່ອຸມຸນຊົນ.

ເມື່ອມີບາງຄົນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ, ການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບຄືນອີ່ມແມ່ນຍາກຂຶ້ນ. ເມື່ອເດັກນ້ອຍທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນມັນຈະປ້ອງກັນ:

- ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ.
- ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນພະຍາດທີ່ຮຸນແຮງຈາກການເປັນໂຄວິດ-19.

ຖ້າວ່າເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ມັນຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ທຸລະກິດສາມາດເປີດກິດຈະການໄດ້.

ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ

- ບໍ່ມີວັກຊີນຊະນິດໃດໄດ້ຖືກທົດສອບຄວາມປອດໄພຫຼາຍຄັ້ງແນວນີ້ ໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ.
- ຢາວັກຊີນໄດ້ຖືກພິສູດວ່າປອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ລວມທັງ ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍເຊື້ອຊາດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ອາຍຸ.
- ບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ວ່າວັກຊີນຈະເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານບໍ່ມີລູກໃນອານາຄົດ.

ວັກຊີນຟຣີສໍາລັບທຸກຄົນ

- ທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານສາມາດຮັບຢາວັກຊີນຟຣີໂດຍບໍ່ຄໍານິງເຖິງ **ສະຖານະພາບການເຂົ້າເມືອງ**.
- ບໍ່ວ່າຈະເປັນທ່ານເອງ ຫຼື ລູກຂອງທ່ານ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ **ສະແດງບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ມີ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ເພື່ອຮັບຢາວັກຊີນຟຣີ**.

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ

ເມື່ອລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດ-19, ພວກເຂົາສາມາດກັບໄປສູ່ກິດກະຈໍາປົກກະຕິຂອງພວກເຂົາ ເຊັ່ນ ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ການຫຼິ້ນກິລາ, ແລະ ຍ້ຽມຢາມ ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຢ່າງໄດ້ປອດໄພ.



ຢູ່ບ່ອນນັດໝາຍ:

- ກ່ອນທີ່ນາງພະຍາບານ ຫຼື ທ່ານໝໍຈະສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ, ພວກເຂົາຈະບອກທ່ານ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ, ທິບທວນເບິ່ງປະຫວັດການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງລູກທ່ານ ແລະ ກໍ່ຈະສອບຖາມ ທ່ານຄືກັນຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ.
- ລູກຂອງທ່ານຈະຕ້ອງພັກເປັນເວລາ 15–30 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາບໍ່ແພ້ຢາ.



ຜົນຂ້າງຄຽງລະດັບກາງ ແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິ

ຜົນຂ້າງຄຽງບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າລູກຂອງທ່ານຈະເປັນໂຄວິດ-19.

ຜົນຂ້າງຄຽງ ໝາຍເຖິງວັກຊີນກໍາລັງສອນຮ່າງກາຍ ຂອງລູກທ່ານໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບໂຄວິດ-19 ໄດ້ແນວໃດ.

ຜົນຂ້າງຄຽງອາດຈະປະກອບດ້ວຍ:

- ປອດແຂນ ຫຼື ແຂນໃຄ່ ຢູ່ບ່ອນທີ່ສັກວັກຊີນ
- ເມື່ອຍ
- ເຈັບຫົວ
- ປອດກ້າມຊີ້ນ
- ໝາວສິ້ນ
- ເປັນໄຂ້
- ປອດ



ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຮຸນແຮງ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາກ

ວັກຊີນແມ່ນປອດໄພ. ລູກຂອງທ່ານຈະເຈັບ ປ່ອຍຂັ້ນຮຸນແຮງຈາກການເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າການສັກຢາວັກຊີນ.

ໄວລຸ້ນຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ມີປະສິບກັບຜົນຂ້າງຄຽງ ເຊັ່ນ ຫົວໃຈອັກເສບ (ເອີ້ນວ່າ ກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈອັກເສບ - myocarditis ຫຼື ເຫຍື່ອຫຸ້ມຫົວໃຈອັກເສບ - pericarditis) ຫຼື ເລືອດກ້າມ.

- ຜົນຂ້າງຄຽງຂັ້ນຮຸນແຮງ ພົບເຫັນໄດ້ຍາກ
- ຜົນຂ້າງຄຽງຂັ້ນຮຸນແຮງ ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ ແລະ ຄົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ມີອາການເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນປິ່ນປົວເຊົາແລ້ວ
- ປະຕິທິດຂອງວັກຊີນແມ່ນດີກວ່າຜົນຂ້າງຄຽງຂອງມັນ

ສອບຖາມທ່ານໝໍເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ບອກໃຫ້ທ່ານໝໍ ແລະ ນາງພະຍາບານຂອງລູກທ່ານເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລະ ວັກຊີນອື່ນໆທີ່ລູກຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ.



ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: cdc.gov/coronavirus