

حقایق را دریافت کنید.

پس از تزریق واکسن ایمن بمانید.
از جامعه تان حفاظت کنید.



تا دو هفته بعد از آخرین تزریق، به طور کامل در برابر کووید 19 ایمن نخواهید بود.


- اگر واکسن با دو تزریق انجام داده اید، باید تا مدت 2 هفته بعد از دومین تزریق صبر کنید.
- اگر واکسن با یک تزریق انجام داده اید، باید به مدت 2 هفته بعد از تزریق واکسن صبر کنید.

پس از تزریق واکسن ایمن بمانید.

کارشناسان نمی دانند که واکسن تا چه مدتی از سلامت شما در مقابل کووید 19 محافظت خواهد کرد و اینکه آیا شما بعد از واکسیناسیون نیز ویروس کووید 19 را به دیگران منتقل خواهید کرد یا خیر. حتی بعد از انجام واکسیناسیون، باید همچنان:



ماسک بزنید



فاصله اجتماعی را رعایت کنید.



از اجتماعات پر ازدحام دوری کنید.



دستهایتان را مرتباً بشویید.



جاهایی را که زیاد با آن در تماس هستید ضدعفونی کنید

در شرایط زیر، حتی اگر به طور کامل واکسن شده اید، آزمایش کرونا فوراً انجام دهید:

اگر در نزدیکی فرد مبتلا به کووید 19 قرار گرفته و احساس بیماری کنید. همچنین در خانه بمانید و از دیگران دوری کنید.

اگر با تعداد زیادی از افراد زندگی می کنید و به فردی مبتلا به کووید 19 نزدیک شده اید. حتی اگر احساس بیماری نمیکنید، آزمایش کرونا را انجام دهید. همچنین در خانه بمانید و از دیگران دوری کنید.

