

ໄດ້ຮັບຂໍ້ເທັດຈິງ.

ຢູ່ຢ່າງປອດໄພພາຍຫຼັງທີ່ຮັບການສັກຢາອັກຊິນ.
ປ້ອງກັນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.



ທ່ານຍັງບໍ່ປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19 ເທື່ອຈົນກວ່າຈະຮອດ
ສອງອາທິດຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສັກຢາເຂັ້ມສຸດທ້າຍ!




- ຖ້າທ່ານສັກ ອັກຊິນຊະນິດສອງເຂັ້ມ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າ 2 ອາທິດ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບເຂັ້ມທີສອງ.
- ຖ້າທ່ານສັກຢາອັກຊິນທີ່ຕ້ອງສັກພຽງແຕ່ ເຂັ້ມດຽວ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າ 2 ອາທິດ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ສັກຢາ.

ຢູ່ຢ່າງປອດໄພພາຍຫຼັງທີ່ຮັບການສັກຢາອັກຊິນ

ຊ່ຽວຊານຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າອັນຊິນຈະປ້ອງກັນທ່ານຈາກໂຄວິດ-19 ໄດ້ດົນປານໃດ ຫຼືວ່າທ່ານຍັງສາມາດແຜ່ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໆ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາອັກຊິນແລ້ວຫຼືບໍ່. ເຖິງວ່າໄດ້ຮັບອັກຊິນແລ້ວກໍຕາມ, ໃຫ້ສືບຕໍ່:



ໃສ່ຜ້າປິດປາກ.



ປະຕິບັດມາດຕະການ
ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງ
ສິ່ງຄືນ.



ຫຼີກລ່ຽງການເຂົ້າຮ່ວມ
ງານລ້ຽງທີ່ມີຄົນ
ຈໍານວນຫຼາຍ.



ໝັ້ນລ້າງ ມື
ຂອງທ່ານເລື້ອຍໆ



ໝັ້ນຂ້າເຊື້ອບ່ອນທີ່ມີການ
ສໍາພັດເປັນປະຈໍາ

ເຖິງວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາອັກຊິນແລ້ວກໍຕາມ, ເຂົ້າກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັນທີຖ້າວ່າ:



ທ່ານໄດ້ຢູ່ໃກ້ ຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ເລີ່ມມີອາການໄຂ້. ຍັງຕ້ອງພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນໆ.

ທ່ານ ອາໄສຢູ່ກັບຫຼາຍຄົນ ແລະໄດ້ ຢູ່ໃກ້ກັບຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19. ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າເປັນໄຂ້ກໍຕາມ, ຄວນໄປກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ ພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນໆ.