


ຮັບຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ.

ການກວດໂຄວິດ-19 ຊ່ວຍປົກປ້ອງຊຸມຊົນ

ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແລ້ວກໍຕາມ, ທ່ານສາມາດຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ເພາະວ່າທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກເປັນໄຂ້ເລີຍ. ເມື່ອທ່ານກວດຫາເຊື້ອ ທ່ານໄດ້ປົກປ້ອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຕົວຂອງທ່ານເອງ.

ຄົນເຂົ້າຮັບການກວດ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າເຂົາໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຫຼືບໍ່ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈວ່າ ພວກເຂົາຈະເປັນໄຂ້ຫຼືບໍ່ ເນື່ອງຈາກມັນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາປອດໄພຂຶ້ນ. ທຸກຄົນສາມາດຮັບການກວດລວມທັງ ຜູ້ໃຫຍ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່.



ເມື່ອໃດທີ່ຈະຕ້ອງກວດ

- ຖ້າທ່ານມີອາການ
- ຖ້າທ່ານໄດ້ໃກ້ຊິດກັບຄົນອື່ນທີ່ມີຜົນກວດເປັນບວກ
- ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກການເດີນທາງ
- ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງໃນກຸ່ມທີ່ມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍ
- ຖ້າວ່າເປັນການຮຽກຮ້ອງຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກ



ອາການ

- ເປັນໄຂ້
- ໄອ
- ຫາຍໃຈຝືດ
- ອ່ອນເພຍ (ອິດເມື່ອຍ)
- ເຈັບຄໍ
- ນ້ຳມູກໄຫຼ ຫຼື ຕັນດັນ
- ປວດກ້າມຊີ້ນ ຫຼື ປອດຕິນໂຕ
- ເຈັບຫົວ
- ປວດ ຫຼື ຖອກທ້ອງ
- ສູນເສຍການຮັບລົດຊາດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກິນ

ເນື່ອງຈາກອາການຂອງໂຄວິດ-19, ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ແລະ ໄຂ້ຫວັດຕາມລະດູການ ແມ່ນມີລັກສະນະຄ້າຍກັນ, ມີທາງດຽວທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ທ່ານເປັນໂຄວິດຫຼືບໍ່ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດເທົ່ານັ້ນ.

ສະຖານທີ່ເຂົ້າຮັບການກວດ

ມີຫຼາຍສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປກວດໄດ້

ທ່ານອາດຈະຂໍກວດຢູ່ຫ້ອງການຂອງແພດ, ຈຸດກວດໃນຊຸມຊົນ, ບ່ອນເຮັດວຽກ, ໂຮງຮຽນ, ຫຼື ຮ້ານຂາຍຢາ. ຮ້ານຂາຍຢາຫຼາຍແຫ່ງຍັງໃຫ້ທ່ານກວດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ເຮືອນ.

ການກວດແມ່ນເປັນຄວາມລັບ

ທ່ານສາມາດກວດເປັນຄວາມລັບ ໂດຍສົນໃຈສະຖານະພາບການເຂົ້າເມືອງຂອງທ່ານ ຫຼື ທ່ານຈະມີປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ.

ການກວດແມ່ນວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ


ມີຫຼາຍທາງເລືອກໃນການກວດ

ທ່ານ ຫຼື ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບອາດຈະໃຊ້ການກວດຈາກຜຶ້ງດັງ, ຄໍ, ຫຼື ນໍ້າລາຍຂອງທ່ານ. ການກວດບາງລາຍການ ແລະ ອື່ນໆແມ່ນມີໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່ຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງທ່ານ.

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງລໍຖ້າຜົນກວດ

ການກວດບາງປະເພດອາດຈະແຈ້ງຜົນກວດໃຫ້ທ່ານຮູ້ທັນທີ, ແລະ ການກວດບາງປະເພດອາດໃຊ້ເວລາເປັນມື້ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າເປັນໄຂ້ ປົກປ້ອງຄົນອື່ນໆດ້ວຍການພັກຢູ່ເຮືອນ, ໃສ່ຜ້າປິດປາກ, ແລະ ປະຕິບັດການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ.



ຖ້າທ່ານກວດມີຜົນເປັນບວກ

ຖ້າທ່ານມີຜົນກວດເປັນບວກ ຫຼື ຕະຫຼອດເວລາທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າເປັນໄຂ້ໃຫ້ພັກຢູ່ເຮືອນບໍ່ຄວນໄປວຽກ, ໂຮງຮຽນ, ຫຼື ພົບປະສັງຄົມ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານຈະປ້ອງກັນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

ດູແລຕົວທ່ານເອງດ້ວຍການພັກຜ່ອນ, ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ, ແລະ ໂທຫາທ່ານໝໍ ຖ້າອາການຂອງທ່ານຮຸນແຮງ.



ຖ້າຜົນກວດຂອງທ່ານເປັນລົບ

ສືບຕໍ່ປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງໂດຍການໃສ່ຜ້າປິດປາກ, ປະຕິບັດເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ, ແລະ ພັກຢູ່ເຮືອນເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກເປັນໄຂ້.

ກວດອີກຄັ້ງຖ້າວ່າອາການຂອງທ່ານບໍ່ດີຂຶ້ນ ຫຼື ເລື້ອຍໆຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານຍັງຄົງປ້ອງກັນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນເທື່ອ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາເຂັມກະຕຸ້ນ, ທ່ານສາມາດສັກຢາຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຫາຍດີແລ້ວ. ຖາມທ່ານໝໍວ່າທ່ານສາມາດສັກຢາວັກຊີນໄດ້ເມື່ອໃດ.



ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ, ໄປສັກເລີຍ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນແລ້ວ, ໃຫ້ສັກຢາເຂັມກະຕຸ້ນເພື່ອປ້ອງກັນທ່ານເອງ ແລະ ຄົນອື່ນໆ.

ປ້ອງກັນຕົວຂອງທ່ານ. ປ້ອງກັນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. ຮັບຢາວັກຊີນ.