

ຮູ້ຄວາມຈິງ.

ຢູ່ຢ່າງປອດໄພພາຍຫຼັງທີ່ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ.
ປ້ອງກັນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.



ການປ້ອງກັນໄດ້ດີທີ່ສຸດຂອງວັກຊີນແມ່ນຫຼັງຈາກສັກ
ເຂັມສຸດທ້າຍໄດ້ສອງອາທິດ.




ເພື່ອການຢູ່ຢ່າງປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19, ມັນສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຮັບການສັກຢາ
ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຕາມກຳນົດ, ລວມເຖິງການເຂົ້າຮັບການສັກຢາເຂັມກະຕຸ້ນ
ເມື່ອທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ.

ຢູ່ຢ່າງປອດໄພພາຍຫຼັງທີ່ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ

ເຖິງວ່າໄດ້ຮັບວັກຊີນແລ້ວກໍຕາມ, ໃຫ້ສືບຕໍ່:



ໃສ່ຜ້າປິດປາກ.



ປະຕິບັດມາດຕະການ
ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງ
ສັງຄົມ.



ຫຼີກລ່ຽງການເຂົ້າຮ່ວມ
ງານລ້ຽງທີ່ມີຄົນ
ຈຳນວນຫຼາຍ.



ໝັ່ນລ້າງມືຂອງທ່ານ
ເລື້ອຍໆ.



ຂ້າເຊື້ອ
ສຳພັດເລື້ອຍໆ
ບໍລິເວນ.

ເຖິງວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແລ້ວກໍຕາມ, ເຂົ້າກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັນທີຖ້າວ່າ:



ທ່ານໄດ້ຢູ່ໃກ້ ຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ເລີ່ມມີອາການໄຂ້. ຍັງຕ້ອງພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນໆ.
ທ່ານ ອາໄສຢູ່ກັບຫຼາຍຄົນ ແລະໄດ້ ຢູ່ໃກ້ກັບຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19. ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າເປັນໄຂ້ກໍຕາມ,
ໃຫ້ໄປຮັບການກວດ. ຍັງຕ້ອງພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນໆ.