


ຮູ້ຄວາມຈິງ.

ການຕິດເຊື້ອທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊີນ

ຄົນສ່ວນຫຼາຍທີ່ເຈັບປ່ວຍໜັກຈາກໂຄວິດ-19 ແມ່ນຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຂອງພວກເຂົາຕາມກຳນົດ.

ຕາມກຳນົດໝາຍເຖິງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນສອງເຂັມ ສຳລັບຊະນິດສັກສອງເຂັມ ແລະ ຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນທີ່ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ.



ວັກຊີນປ້ອງກັນການປ່ວຍໄຂຂຶ້ນຮຸນແຮງ

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຕິດເຊື້ອເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊີນ, ຢາວັກຊີນຍັງຄົງປ້ອງກັນທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຈາກການປ່ວຍທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ.



ວັກຊີນແມ່ນປອດໄພ.

ປອດໄພ: ຢາວັກຊີນໄດ້ຖືກພິສູດວ່າປອດໄພສຳລັບຫຼາຍພັນຄົນ, ລວມທັງ ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານເຊື້ອຊາດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ອາຍຸ. ໃນຂະນະທີ່ຜົນຂ້າງຄຽງລະດັບກາງແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິ, ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຮຸນແຮງຈາກຢາວັກຊີນແມ່ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຂ້າງຄຽງແມ່ນເຊົາແລ້ວ.

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ມີປະສິດທິພາບດີຫຼາຍ.

ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນຕົວເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານແມ່ນການຕິດຕາມການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຕາມກຳນົດ.

ຖ້າທາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຕາມກຳນົດ, ທ່ານອາດຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19, ມີອາການເຈັບປ່ວຍຂັ້ນຮຸນແຮງ ເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໄດ້.



ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊີນໄດ້

ເຖິງວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຕາມກຳນົດແລ້ວກໍຕາມ, ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານຈະປອດໄພທີ່ສຸດຖ້າວ່າທ່ານໃສ່ຜ້າປິດປາກ.

ປະຕິບັດມາດຕະການເວັ້ນໄລຍະທ່າງທາງສັງຄົມ, ຫຼີກລ່ຽງການເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງທີ່ມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍ, ແລະ ໝັ້ນລ້າງມືຂອງທ່ານເລື້ອຍໆ ແມ່ນທາງໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຕົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄົນອື່ນປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19.

ປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງ. ປ້ອງກັນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. ຮັບຢາວັກຊີນ.