

ຮູ້ຄວາມຈິງ.

ວັກຊີນແມ່ນຟຣີສໍາລັບທຸກຄົນ.



- ບໍ່ມີໃຜປະຕິເສດການໃຫ້ຢາວັກຊີນຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນ.
- ຢາວັກຊີນແມ່ນຟຣີສໍາລັບທຸກຄົນ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານະການເຂົ້າເມືອງຂອງທ່ານ ຫຼື ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີ ຫຼື ບໍ່ມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປະກັນສຸຂະພາບກໍຕາມ.


ວັກຊີນປ້ອງກັນທ່ານຈາກການເປັນໂຄວິດ-19.

- ຖ້າທ່ານຍັງເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຢູ່, ວັກຊີນປ້ອງກັນທ່ານຈາກການເປັນໄຂ້ຮຸນແຮງ.
- ເຖິງວ່າຖ້າທ່ານເປັນໂຄວິດ-19, ທ່ານຄວນຈະຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ.
- ການຕິດຕາມການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຕາມກຳນົດ ແມ່ນລວມທັງການສັກຢາວັກຊີນເຂັ້ມກະຕຸ້ນເມື່ອທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ.



ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ວັກຊີນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນໂຄວິດ-19.

- ການຮັບຢາວັກຊີນ ແມ່ນປອດໄພກວ່າການເປັນໂຄວິດ-19.
- ຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພຈາກການສັກຢາວັກຊີນ.
- ບໍ່ມີວັກຊີນຊະນິດໃດໄດ້ຖືກທົດສອບຄວາມປອດໄພຫຼາຍຄັ້ງແນວນີ້ ໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ.
- ຢາວັກຊີນໄດ້ຖືກພິສູດວ່າປອດໄພໄດ້ຫຼາຍເທົ່ານີ້ ສໍາລັບຫຼາຍພັນຄົນ, ລວມທັງ ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍເຊື້ອຊາດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ອາຍຸ.
- ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ບໍ່ປ່ຽນແປງ ດີເອັນເອ (DNA) ຂອງທ່ານ.



ຜົນຂ້າງຄຽງແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິ.

ຜົນຂ້າງຄຽງບໍ່ໝາຍເຖິງວ່າທ່ານເປັນໂຄວິດ-19.

- ຜົນຂ້າງຄຽງ ໝາຍເຖິງວັກຊີນກຳລັງສອນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບໂຄວິດ-19.
- ຜົນຂ້າງຄຽງອາດຈະປະກອບດ້ວຍ:
 - ການເຈັບປວດ ຫຼື ການບວມຢູ່ແຂນຂອງທ່ານບໍລິເວນທີ່ທ່ານສັກຢາວັກຊີນ.
 - ເຈັບຫົວ, ໜາວສັນ, ຫຼື ເປັນໄຂ້.
- ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການໃຊ້ເວລາພັກສອງສາມມື້ຈາກການເຮັດ ວຽກຈົນກວ່າທ່ານຈະຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ.
- ທ່ານຕ້ອງພັກປະມານ 15–30 ນາທີ ຫຼັງຈາກທີ່ສັກຢາວັກຊີນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ແພ້ຢາ.



ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ການຈະເລີນພັນຂອງພວກເຂົາໃນອານາຄົດ.

ຢາວັກຊີນແມ່ນປອດໄພສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຈະມີລູກໃນອະນາຄົດ ແລະ ຜູ້ທີ່ກຳລັງຖືພາ ແລະ ໃຫ້ນົມລູກ.



- ສານກັນບູດ
- ໄຂ່
- ຜະລິດຕະພັນຈາກໝູ
- ເຈລາຕິນ
- ຢາງຈາກພືດ (Latex)
- ໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຊີວິດໄວຣັສ

ຕິດຕາມການສັກຢາວັກຊີນຕາມກຳນົດຂອງທ່ານ.

- ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ປ້ອງກັນການເຈັບປ່ວຍຂັ້ນຮຸນແຮງ, ເຖິງຂັ້ນເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ ແລະ ເສຍຊີວິດ.
- ການຕິດຕາມການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຕາມກຳນົດ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທີ່ດີທີ່ສຸດ.
- ຕາມກຳນົດໝາຍເຖິງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນສອງເຂັມ ສຳລັບຊະນິດສັກສອງເຂັມ ແລະ ຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນທີ່ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ.
- ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຕາມກຳນົດ, ທ່ານອາດຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19, ມີອາການເຈັບປ່ວຍຂັ້ນຮຸນແຮງ ເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໆໄດ້.

ຢູ່ຢ່າງປອດໄພພາຍຫຼັງທີ່ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ.

ປັດຈຸບັນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານບໍ່ຮູ້ວ່າວັກຊີນຈະປ້ອງກັນທ່ານໄດ້ດົນປານໃດ. ເຖິງວ່າໄດ້ຮັບວັກຊີນແລ້ວກໍຕາມ, ໃຫ້ສືບຕໍ່:



ໃສ່ ຜ້າປິດປາກ.



ປະຕິບັດມາດຕະການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ.



ໝັ່ນລ້າງມືຂອງທ່ານເລື້ອຍໆ.



ໝັ່ນຂ້າເຊື້ອບ່ອນທີ່ມີການສຳພັດເປັນປະຈຳ.

